# 中醫中藥學

義守大學　學士後中醫學系
謝明村、林立偉

# 各論

第一章　解表藥
第二章　清熱藥
第三章　瀉下藥
第四章　祛風濕藥
第五章　芳香化濕藥
第六章　利水滲濕藥
第七章　溫裏藥
第八章　理氣藥
第九章　消食藥
第十章　驅蟲藥
第十一章　止血藥
第十二章　活血祛瘀藥
第十三章　化痰止咳平喘藥
第十四章　安神藥
第十五章　平肝息風藥
第十六章　開竅藥
第十七章　補虛藥
第十八章　收澀藥
第十九章　湧吐藥
第二十章　外用藥

# 第十章　驅蟲藥

## 前言

- 定義
  - 凡以驅除或殺滅寄生蟲為其主要作用的藥物，稱為驅蟲藥。（蟲除、痛止、積消）
- 功效
  - 主要用於腸寄生蟲病，如蛔蟲病、蟯蟲病、條蟲病、鉤蟲病等。
  - 蟲證患者，每見繞臍腹痛，嘔吐涎沫，不思飲食，或善飢多食，嗜食異物，肛門、鼻、耳瘙癢，久則出現面色萎黃，形瘦腹大，或浮腫乏力等證。

### 蟠尾絲蟲病（河流盲）
### [ONCHOCERCIASIS (RIVER BLINDNESS)]

- 病源體： Onchocerca volvulus 。
- 常發生地區在墨西哥，南美及熱帶非洲。
- 其特徵是皮下節結，搔癢性皮膚疹，與眼球病症常導致失明。
- 治療： Ivermectin 。

### 鞭蟲病
### [TRICHURIASIS (WHIPWORM DISEASE)]

- 病源體： Trichuris trichiura 。
- 感染後通常沒有症狀，然而，會出現腹痛、腹瀉及腹脹。
- 治療： mebendazole 。

### 蟯蟲病 (ENTEROBIASIS)

- 病源體： Enterobius vermicularis 。
- 是美國最常見的蠕蟲感染。
- 肛門搔癢並可見白色蟲體於糞便中或肛門周圍。
- 治療： mebendazole 或 pyrantel pamoate 。



### 鉤蟲病 (HOOKWORM DISEASE)

- 病源體： Ancylostoma duodenale（舊地區鉤蟲）， Necator americanus（新地區鉤蟲）。
- 蟲體會附著在腸黏膜，造成厭食，類似潰瘍的症狀與慢性小腸血液流失而導致貧血。
- 無貧血患者若無出現症狀可不需治療。
- 治療： pyrantel pamoate 或 mebendazole 。

### 蛔蟲病（圓蟲病）
### [ASCARIASIS (ROUNDWORM DISEASE)]

- 病源體： Ascaris lumbricoides 。
- 在美國為僅次於蟯蟲感染之多細胞寄生蟲；全世界有將近三分之一的人口受此種蟲體感染。
- 食入蟲卵在腸道中生長，造成腹部症狀，包

### 糞小桿線蟲病
### [STRONGYLOIDIASIS (THREADWORM DIS-

- 配伍
  - 根據寄生蟲的種類及患者體質的強弱而選用適當的驅蟲藥，並須視具體證情而配伍相應的藥物。
    - 積滯者，同配伍消積導滯藥。
    - 便祕者，當配伍瀉下藥，可有助於蟲體排出。
    - 脾胃虛弱、運化失常者，可酌配健運脾胃之品。
    - 對於體虛的患者，應攻補兼施，或先補後攻。

- 注意事項
  - 驅蟲藥一般應在空腹時服，使藥力較易作用於蟲體，以收驅蟲之效。
  - 本類藥物中，部分藥物具有相當的毒性，應用時必須注意劑量，以免損傷正氣。在發熱或腹痛較劇時，暫時不宜使用驅蟲藥。孕婦、老弱患者都應慎用。

# 使君子

- 【來源】本品係使君子科植物使君子 *Quisqualis indica* L. 的乾燥成熟果實。
- 【性味與歸經】甘，溫，有小毒。歸脾、胃經。
- 【功效】殺蟲消積，主要用於驅蛔蟲。治療輕型蛔蟲病、蟯蟲病、蟲積腹痛、小兒疳積、消化不良、腹瀉等症。

使君子(長紡錘梭,黑褐,平滑光澤,五縱稜)

# 【應用 I】

- 殺蟲消積 （蟲積腹痛）
  - 為治小兒蛔蟲常用藥，可用使君子仁炒香嚼食，如與苦楝根皮、檳榔等同用，可提高療效
  - 驅鉤蟲配榧子；蟯蟲配百部；與大黃同用，可治腸道滴蟲病。
  - 小兒疳積。蟲積發熱者，配胡黃連、蕪荑；乳食不消者，配麥芽、神曲；若見便溏溲濁，須與健脾滲濕之黨參、白朮、扁豆、茯苓等藥同用。

- 【使用注意】
  - 內服：煎湯，使君子 9~12 g，打碎入煎；或小兒每歲 1 粒，成人 15~20 粒，炒黃或生品，睡前嚼服，連服 3 日，或入丸、散。
  - 大量服用能引起呃逆、眩暈、嘔吐等反應；服藥時忌飲濃茶；忌喝熱水，亦能引起呃逆。一般在停藥後即可緩解，亦可用丁香泡水頻飲解毒。

# 【本草備要】

- 性味：甘溫。
- 功能：健脾胃，除虛熱，殺臟蟲。
- 主治：
  - 治五疳便濁，瀉痢瘡癬，為小兒諸病要藥。
- 禁忌：
  - 忌飲熱茶，犯之作瀉。

# 苦楝皮

- 【來源】本品係苦楝子之原植物則為同屬植物楝樹 *Melia azedarach* L. 的根皮。
- 【性味歸經】苦，寒。有毒。歸脾、胃、肝經。
- 【功效】殺蟲，療癬。

苦楝皮(板狀卷筒,灰棕,縱皺,點狀棕皮孔,內表淡黃,纖維)

苦楝皮

# 【應用 I】

- 用於蛔蟲病、鉤蟲病、蟯蟲病。
  - 本品殺蟲作用較強，療效較佳。治蛔蟲病，可單用煎服；若與檳榔配伍，能增強殺蟲之力，既可用以驅蛔，又可用於鉤蟲病；治蟯蟲病，可用本品配合百部、烏梅，每晚煎取濃液灌腸，連用 2~4 天。
- 此外，尚可用治頭癬、疥瘡，以本品研末，用醋或豬脂調塗患處。

【使用注意】本品有一定毒性，不宜持續和過量服用。體虛者慎用，肝病患者忌用。

# 檳榔

- 【來源】
  - 本品係棕櫚科植物檳榔 *Areca catechu* L. 的乾燥成熟種子。
- 【別名】
  - 大腹子
- 【性味與歸經】
  - 辛、苦，溫。歸胃、大腸經。

檳榔(圓錐,黃棕,底截平中凹,堅重不易碎)

檳榔片 {花片}(棕白相間大理石花紋,檳榔紋)

- 【功效】驅蟲、健胃、利尿消腫藥。為中藥中重要的有效驅蟲藥。用於：
  - 條蟲，對豬肉條蟲療效甚佳。
  - 蛔蟲、鞭蟲有一定效果。
  - 痢疾初起時配伍使用有助於減輕腸內異常發酵和促進炎症滲出物的排出，減輕裏急後重。
  - 腳氣病、肝硬化腹水。

# 【應用 I】

- 消積行氣
  - 脾胃氣滯，胸腹脹滿疼痛，常與枳殼、厚朴、木香等同用。
  - 食積所致者，可加山楂、麥芽、砂仁；因於痰濕者，可加半夏、橘紅、萊菔子等。若積滯不化，大便秘結者，可與枳實、大黃同用。
  - 濕熱痢疾，裏急後重，常與木香、黃連、黃芩、芍藥等配伍。

# 【應用 II】

- 驅蟲
  - 多種腸寄生蟲病，如絛蟲、薑片蟲、鉤蟲、蛔蟲、蟯蟲等，可與苦楝根皮、使君子、蕪荑等同用。臨床尤多用於絛蟲病，如與南瓜子仁配用，則驅絛的作用更佳。

# 【應用III】

- 利水
  - 水濕壅阻，水腫、喘促，二便不利。可與澤瀉、豬苓、茯苓、葶藶子等同用。
  - 寒濕腳氣，足脛腫重或痲痺冷痛，可配木瓜、吳茱萸、紫蘇等。
- 其他
  - 瘧疾，可與常山、草果、青皮同用。此外，本品煎液滴眼有降低眼內壓和縮瞳作用，可用於治療青光眼。也可研末外用，治腫毒、瘡痛。

- 【使用注意】氣虛及脾虛便溏者不宜用。大劑量時可出現噁心、嘔吐、腹瀉、頭暈。煎劑冷服，可減少副作用。
  - 《食療本草》：“多食發熱。”
  - 《本草蒙筌》：“久服則損真氣，多服瀉至高之氣，較諸枳殼、青皮，此尤甚也。”
  - 《神農本草經疏》：“凡病屬陰陽兩虛，中氣不足，而非腸胃壅滯、宿食脹滿者，悉在所忌。”

# 【本草備要】

- 性味：苦辛溫。
- 功能：
  - 苦溫破滯，辛溫散邪，瀉胸中至高之氣，使之下行。
  - 性如鐵石，能墜諸藥至於下極。
  - 攻堅去脹，消食行痰，下水除風，殺蟲醒酒。
- 主治：
  - 治痰癖癥瘕，瘴癘瘧痢，水腫腳氣。
  - 治大小便氣秘，裏急後重。
- 禁忌：過服則損真氣。

# 大腹皮

- 【來源】
  - 檳榔的果皮
- 【性味與歸經】性味辛，微溫。歸脾、胃、大腸、小腸經。
- 【功效】下氣寬中，利水消腫。用於濕阻氣滯，脘腹痞悶脹滿、大便不爽及水腫、腳氣等證。
  - 其功效較檳榔緩和

大腹皮(瓢狀,黃灰硬殼,縱纖維,輕)

# 雷丸

- 【來源】本品係多孔菌科植物雷丸菌 *Omphalia lapldescens* Schroet. 的乾燥菌核。本品為不規則的褐色圓形塊，古人認為由雷震而成，狀如圓丸，故名。
- 【性味與歸經】苦，寒；有小毒。歸胃、大腸經。
- 【功效】殺蟲消積。為驅絛蟲常用藥。其次是治蟯蟲和蛔蟲。

雷丸(不規則團塊,灰棕黑,質堅實不易破裂)



雷丸片(半透明薄片,黃白黃棕,角質,多數白色輪狀細花紋)

# 【應用Ｉ】

- 殺蟲
  - 用於絛蟲，鉤蟲、蛔蟲病，痞積腹痛，小兒疳積。
  - 配使君子：均殺蟲效力倍增，消積滯功效卓著。治小兒諸蟲，蟲積腹痛。
  - 配榧子：各具專長殺諸蟲效優，相配力強治蟲積腹痛。配柳枝：去瘙癢，光皮膚，防暑瘡、止癢疼，治皮膚瘙癢，防暑月生瘡。

# 【使用注意】

- 有蟲積而脾胃虛寒者慎服。**忌高溫**、忌酸，不宜入煎劑，不宜與酸性食物同用。
  - 《名醫別錄》："久服令人陰痿。赤者殺人。"
  - 《藥對》："惡葛根。"
  - 《藥性論》："惡萹蓄、（葛）根。"

# 【本草備要】

- 性味：苦寒有小毒。
- 歸經：入胃大腸經。
- 功能：功專消積殺蟲。

# 鶴虱

- 【來源】為菊科植物天名精 *Carpesium abrotanoides* L. 的乾燥成熟果實。呈細小圓柱形，表面黃褐色或暗褐色，具多數縱稜，子極臭而刺人衣，勢似於虱，故名。
- 【性味歸經】苦、辛，平；有小毒。歸脾、胃經。
- 【功效】殺蟲消積。



鶴蝨(瘦果雙懸小堅粒,隆突4稜線,密鉤刺)

# 【應用Ｉ】

- 殺蟲
  - 功能殺蟲消疳。用於蛔蟲、蟯蟲、條蟲等多種腸寄生蟲病。可用本品研末或製成蜜丸服。
  - 臨床常與其他殺蟲藥同用。如治蛔蟲病，配苦楝皮、使君子；蟯蟲病，配百部、檳榔；條蟲病，配檳榔、鶴草芽、南瓜子等。
  - 若蟲積內阻，腹痛拒按，便秘脈實者，可再加黑丑、大黃等攻下消積之品；蟲積腹痛，肢冷者，則加附子、乾薑；小兒疳積，腹大青筋顯露者，常與蘆薈、胡黃連、五穀蟲等同用。此外，鶴虱與米醋同煎含漱，可治齲齒疼痛。

# 【本草備要】

- 性味：苦辛有小毒。
- 功能：殺五臟蟲。
- 主治：治蚘囓，腹痛。

# 榧子

- 【來源】為紅豆杉科常綠喬木植物榧 Torreya grandis Fort. 的成熟種子
- 【性味歸經】甘、澀，平。歸肺、大腸經。
- 【功效】殺蟲。

榧實(卵圓長,黃棕,凸密縱棱,硬脆易砸,斷面油)

# 【應用】

- 能殺蟲，消積
  - 用於蟲積腹痛。有良好的驅蟲作用，且能潤腸通便，助蟲體排出。單用或配伍應用，治鉤蟲病、蛔蟲病，可與使君子、苦楝皮等同用；治絛蟲病，可配檳榔、南瓜子。
- 潤肺止咳
  - 治肺燥咳嗽。

- 【使用注意】內服不可過量。
  - 《物類相感志》：“榧子殼反綠豆。”
  - 《本草衍義》：“食之過多則滑腸。”
  - 《隨息居飲食譜》：“多食助火，熱嗽非宜。”

【本草備要】

- 性味：甘澀。
- 功能：潤肺，殺虫。

# 蕪荑

- 【來源】本品係榆科植物大果榆 *Ulmus macrocarpa* Hance 的果實經加工而成。
- 【性味與歸經】辛、苦，溫。歸脾、胃經。
- 【功效】殺蟲消疳。用於：
  - 蟲積腸痛，小兒疳瀉。
  - 冷痢，久痢不止，脫肛。

# 【應用】

- <u>殺蟲消積</u>
  - 蛔蟲、絛蟲等腸道寄生蟲病，單用或配伍鶴虱、檳榔、苦楝根皮、使君子等殺蟲藥，以增強療效。若見面黃形瘦，大便溏瀉，虛熱易驚，常配神曲、麥芽、黃連等同用，以殺蟲消積；若瀉痢日久，脾胃受損，可配伍白朮、木香等健運脾胃。
- 蕪荑研末用醋調塗，可治疥癬。

# 【本草備要】

- 性味：辛苦溫
- 功能：辛散滿，苦殺蟲，溫燥濕化食。
- 主治：
  - 祛五臟皮膚肢節風濕，心腹積冷，癥痛鼈瘕。
  - 痔瘻瘡癬，<u>小兒驚疳冷痢，胃中有蟲，食即作痛</u>。

# 貫眾

- 【來源】
  - 綿馬貫眾為鱗毛蕨科（Dryopteridaceae）植物粗莖鱗毛蕨 Dryopteris crassirhizoma n Nakai 之帶葉柄殘基的乾燥根莖。
- 【性味與歸經】
  - 味苦、澀、微寒；有小毒。歸肝、脾經。

貫衆(粗莖鱗毛蕨)(棕黃鱗片鱗毛

貫衆片

貫衆片

- 【功效】清熱解毒、殺蟲、止血。用於：
  - 流行性感冒、乙型腦炎、肺炎、腮腺炎。
  - 驅絛蟲、蟯蟲、鉤蟲、多種腸寄生蟲病。
  - 吐血、衄血、便血、崩漏等出血證、子宮收縮無力而致的產後出血。

# 【應用 I】

- 殺蟲
  - 絛蟲、鉤蟲、蛔蟲、蟯蟲等多種腸道寄生蟲病。驅絛蟲，可配檳榔、雷丸；驅鉤蟲，配鶴虱、土荊芥；驅蟯蟲，可與胡粉、蕪荑同用；驅蛔蟲，可與苦楝皮、使君子、檳榔同用。亦用於治療絲蟲病。

# 【應用 II】

- 止血
  - 血熱出血證，常與側柏葉、仙鶴草、陳棕炭同用。
    - 如崩漏夾瘀，血紫有塊，少腹脹痛者，加配赤芍、五靈脂
    - 產後出血不止者，加配阿膠，山楂炭、荊芥炭
    - 腸風便血，血痢，配槐花、地榆
    - 胃絡受損吐血者，可與烏賊骨、白芨研粉內服

# 【應用III】

- 清熱解毒
  - 風熱感冒、溫熱斑疹，熱毒癰腫等症，可與銀花、連翹、大青葉、蒲公英等同用。此外，在溫疫流行時，民間常用本品浸於水缸中，飲用其水，或同石菖蒲、蒼朮、雄黃等作煙熏，可預防感染。

- 驅蟲及清熱解毒宜生用，止血宜炒炭用。

【宜忌】陰虛內熱及脾胃虛寒者不宜，孕婦慎用。

# 【本草備要】

- 性味：味苦微寒，有毒。
- 功能：
  - 而能解邪熱之毒。
  - 破癥瘕，發斑痘，化骨哽，殺三蟲。
- 主治：治崩中帶下，產後血氣脹痛。

*I will be back* ！！